Risiko: Stürze

Mit erhöhtem Sturzrisiko assozierte Medikamente:

- Trizyclische Antidepressiva ++
- SSRI +
- Benzodiazepine (lang) ++
- Neuroleptika (+)
- NSAR (+)
- Nitrate (+)
- Diuretika (+)
- Digoxin (+)
- Antiarrhytmika +
- Antihypertensiva (+)

Gesundheitszentrum HORST

Risiko: Akute Verwirrtheit

- Ist ein erheblicher Risikofaktor für prolongierte stationäre Behandlung
- Risikofaktoren sind:
    - Infektionen (Harnwegsinfekt, Pneumonie)
    - bekannte Demenz
    - Elektrolytstörungen
    - Nierenfunktionsstörungen
    - Traumata
- Anticholinerge Medikamentenwirkungen spielen eine wichtige Rolle

Medikamente mit anticholinergen NW

- Trizycl. Antidepressiva – Amitriptylin +++
- Neuroleptika - Phenothiazin (Atosil) +++
- Benzodiazepine - alle ++
- Parkinson-Therapeuitika L-Dopa, Agonisten ++
- H2-Antagonisten - Cimetidin +++
- Digitalis - (auch bei normalem Spiegel +
- Antibiotika - Penicilline,Chepalosporine, Gyrasehemmer ++
- Opiate +++
- NSAR ++
- Theophyllin ++

Gesundheitszentrum HORST

Risiko: Psychopharmaka-Nebenwirkungen

mit potentiell dramatischen Folgen im Alter

- Sedierung ➔ Sturzgefahr
- Parkinsonoid ➔ Sturzgefahr
- Anticholinerge NW ➔ Delirgefahr, Synkopen, Tachykardie, Demenzverschlechterung
- Orthostase ➔ Sturzgefahr
- Kardiale NW ➔ Synkopen, QTc/Torsade de Pointes. Tachykardie, Bradykardie
- Metabolische NW ➔ Diabetesdekompensation, Risikoerhöhung kardio- oder cerebrovaskulärer Ereignisse

Gesundheitszentrum HORST