Paracetamol (Acetaminophen)

Wirkstoffgruppe:	Anilinderivate
Handelsnamen:	Ben-u-ron, Paracetamol Stada, etc.
Wirkungen:	antipyretisch, analgetisch, nur sehr gering antiphlogistisch
Unerwünschte Wirkungen:	allergische Hauterkrankungen, Kopfschmerzen, Bronchospasmus, Nieren-, Leberschäden
Kontraindikationen:	Anwendungsbeschränkungen bei Leberfunktionsstörungen vorgeschädigte Niere
Inkompatibilitäten:	Alkohol, Phenytoin
geriatrische Patienten:	geeignet
WHO Stufe:	**I**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Metamizol (Novaminsulfonsäure)

Wirkstoffgruppe:	Pyrazolonderivate
Handelsnamen:	Novalgin, Novamisulfon ratio, etc.
Wirkungen:	antipyretisch, analgetisch
Unerwünschte Wirkungen:	allergische Reaktionen, Bronchospasmus, RR↓. Stevens-Johnson-/Lyell-Syndrom, Leukopenie, Agranulozytose, Verschlechterung der Nierenfunktion, akute interstitielle Nephritis
Kontraindikationen:	bekannte Allergie gegen Metamizol oder Pyrazolone/Pyrazolidine, bek. Analgetika-Asthma-Syndrom, bek. Analgetika-Intoleranz, akute intermitt. Hepatische Porphyrie
Inkompatibilitäten:	
geriatrische Patienten:	geeignet
WHO Stufe:	**I**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Flupirtin

Wirkstoffgruppe:	zentral wirksame Muskelrelaxantien
Handelsnamen:	Katadolon, Trancopal dolo etc.
Wirkungen:	Muskelrelaxation
Unerwünschte Wirkungen:	Müdigkeit, Schwindel, Nausea, Mundtrockenheit. Leberenzyme↓
Kontraindikationen:	Myasthenia gravis
Inkompatibilitäten:	
geriatrische Patienten:	bedingt geeignet
WHO Stufe:	**I**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Acetylsalicylsäure

Wirkstoffgruppe:	Salicylsäurederivate
Handelsnamen:	Aspirin, ASS ratio, Godamed etc.
Wirkungen:	antipyretisch, analgetisch, antiphlogistisch, thrombozytenaggregationshemmed
Unerwünschte Wirkungen:	allergische Hauterkrankungen, Schwindel, Nausea, Tinnitus, Magen-Darm Ulcera, Bronchospasmus, Blutbildungsstörungen, Nierenfunktionsstörungen, Abzesse bei i.m. Anwendung, Panzytopenie, Strg. Des Säure-Base Haushalts, Blutungszeit ↑
Kontraindikationen:	Magen-Darm Ulcera, Blutbildungsstörungen
Inkompatibilitäten:	Aminoglykoside, Azetaolamid, Methotrexat, Probenecid, Sulfonylharnstoffe, Valproinsäure
geriatrische Patienten:	nicht geeignet
WHO Stufe:	**I**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Diclofenac

Wirkstoffgruppe:	Essigsäurederivate
Handelsnamen:	Allvoran, Diclofenac ratio, Voltaren etc.
Wirkungen:	antipyretisch, analgetisch, antiphlogistisch,
Unerwünschte Wirkungen:	allergische Hauterkrankungen, Schwindel, Nausea, Tinnitus, Magen-Darm Ulcera, Bronchospasmus, Blutbildungsstörungen, Nierenfunktionsstörungen, Abzesse bei i.m. Anwendung
Kontraindikationen:	Magen-Darm Ulcera, Blutbildungsstörungen
Inkompatibilitäten:	Aminoglykoside, Azetaolamid, Methotrexat, Probenecid, Sulfonylharnstoffe, Valproinsäure
geriatrische Patienten:	nicht geeignet
WHO Stufe:	**I**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Ibuprofen

Wirkstoffgruppe:	Propionsäurederivate
Handelsnamen:	Dolormin, Ibu ratio, Imbun etc.
Wirkungen:	antipyretisch, analgetisch, antiphlogistisch,
Unerwünschte Wirkungen:	allergische Hauterkrankungen, Schwindel, Nausea, Tinnitus, Magen-Darm Ulcera, Bronchospasmus, Blutbildungsstörungen, Nierenfunktionsstörungen, Abzesse bei i.m. Anwendung
Kontraindikationen:	Magen-Darm Ulcera, Blutbildungsstörungen
Inkompatibilitäten:	Aminoglykoside, Azetaolamid, Methotrexat, Probenecid, Sulfonylharnstoffe, Valproinsäure
geriatrische Patienten:	nicht geeignet
WHO Stufe:	**I**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Piroxicam

Wirkstoffgruppe:	Oxicame
Handelsnamen:	Brexidol, Piroxicam ratiopharm etc.
Wirkungen:	antipyretisch, analgetisch, antiphlogistisch,
Unerwünschte Wirkungen:	allergische Hauterkrankungen, Schwindel, Nausea, Tinnitus, Magen-Darm Ulcera, Bronchospasmus, Blutbildungsstörungen, Nierenfunktionsstörungen, Abzesse bei i.m. Anwendung
Kontraindikationen:	Magen-Darm Ulcera, Blutbildungsstörungen
Inkompatibilitäten:	Aminoglykoside, Azetaolamid, Methotrexat, Probenecid, Sulfonylharnstoffe, Valproinsäure, Ritonavir
geriatrische Patienten:	nicht geeignet
WHO Stufe:	**I**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Tildin mit Naloxon

Wirkstoffgruppe: weitere Opioid Analagetika

Handelsnamen: Tilidin Hexal comp, Valoron N etc.

Wirkungen: analgetisch, sedativ, atemdepressiv, antitussiv, emetisch und antiemetisch

Unerwünschte Wirkungen:

Kontraindikationen:

Inkompatibilitäten: Cimetidin, MAO-Hemmer

geriatrische Patienten: geeignet

WHO Stufe: **II**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Tramadol

Wirkstoffgruppe:	weitere Opioid Analagetika
Handelsnamen:	Amadol, Tramadolor, Tramal etc.
Wirkungen:	analgetisch, sedativ, atemdepressiv, antitussiv, emetisch und antiemetisch
Unerwünschte Wirkungen:	Schwindel, Unruhe, Verstopfung, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen
Kontraindikationen:	Überempfindlichkeit, Intoxikation v. a. bei gleichzeitigem Alkoholkonsum
Inkompatibilitäten:	Cimetidin, MAO-Hemmer
geriatrische Patienten:	nicht geeignet
WHO Stufe:	**II**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Oxycodon

Wirkstoffgruppe:	Opioid Agonisten
Handelsnamen:	Oxycodon Stada, Oxygesic etc.
Wirkungen:	analgetisch, sedativ, atemdepressiv, antitussiv, emetisch und antiemetisch
Unerwünschte Wirkungen:	Atemdepression, Sedierung, HF↓, hypotensive Kreislaufstrg. Pruritus, Bronchspasmus, Schwitzen, Spasmen der Gallen- und Pankreasweg, Obstipation, Krampfanfälle, Miosis, Toleranzentwicklung, Blasenentleerungsstrg.
Kontraindikationen:	Opioidabhängigkeit, Pankreatitis, Atemstrg.
Inkompatibilitäten:	Cimetidin, MAO-Hemmer
geriatrische Patienten:	geeignet
WHO Stufe:	**III Btm**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Hydromorphon

Wirkstoffgruppe:	Opioid Agonisten
Handelsnamen:	Palladon
Wirkungen:	analgetisch, sedativ, atemdepressiv, antitussiv, emetisch und antiemetisch
Unerwünschte Wirkungen:	Atemdepression, Sedierung, HF↓, hypotensive Kreislaufstrg. Pruritus, Bronchspasmus, Schwitzen, Spasmen der Gallen- und Pankreasweg, Obstipation, Krampfanfälle, Miosis, Toleranzentwicklung, Blasenentleerungsstrg.
Kontraindikationen:	Opioidabhängigkeit, Pankreatitis, Atemstrg.
Inkompatibilitäten:	Cimetidin, MAO-Hemmer
geriatrische Patienten:	geeignet
WHO Stufe:	**III Btm**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Fentanyl

Wirkstoffgruppe:	Opioid Agonisten
Handelsnamen:	Abstral, Durogesic, Fentanyl Hexal etc.
Wirkungen:	analgetisch, sedativ, atemdepressiv, antitussiv, emetisch und antiemetisch
Unerwünschte Wirkungen:	Atemdepression, Sedierung, HF↓, hypotensive Kreislaufstrg. Pruritus, Bronchspasmus, Schwitzen, Spasmen der Gallen- und Pankreasweg, Obstipation, Krampfanfälle, Miosis, Toleranzentwicklung, Blasenentleerungsstrg.
Kontraindikationen:	Opioidabhängigkeit, Pankreatitis, Atemstrg.
Inkompatibilitäten:	Cimetidin, MAO-Hemmer, Amiodaron
geriatrische Patienten:	bedingt geeignet
WHO Stufe:	**III Btm**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST

Morphin

Wirkstoffgruppe:	Opioid Agonisten
Handelsnamen:	Capros, M-long. MST, Sevredol, Morphin Merck etc.
Wirkungen:	analgetisch, sedativ, atemdepressiv, antitussiv, emetisch und antiemetisch
Unerwünschte Wirkungen:	Atemdepression, Sedierung, HF↓, hypotensive Kreislaufstrg. Pruritus, Bronchspasmus, Schwitzen, Spasmen der Gallen- und Pankreasweg, Obstipation, Krampfanfälle, Miosis, Toleranzentwicklung, Blasenentleerungsstrg.
Kontraindikationen:	Opioidabhängigkeit, Pankreatitis, Atemstrg.
Inkompatibilitäten:	Cimetidin, MAO-Hemmer
geriatrische Patienten:	bedingt geeignet
WHO Stufe:	**III Btm**

Gesundheitszentrum HORST
SCHLOSS-APOTHEKE GELSENKIRCHEN-HORST